

# HIPOGLUCEMIA

**Definición:** Cantidad de glucosa en la sangre anormalmente baja. Suele producir pérdidas de conocimiento.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y asco o resistencia.

**Vagotonía:** Se da también en fase de reparación de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos.

La **crisis epileptoide** puede darse de forma brusca y presentar una hipoglucemia seguida de una recuperación prolongada en la que la glucemia puede mantenerse en valores altos por un tiempo. También puede aparecer en fase activa de un conflicto de sobre-agotamiento con estrés agudo.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIABETES. La hipoglucemia aparece en la diabetes insípida. Hay una deficiencia funcional de las células alfa de los islotes de Langerhans (páncreas), y aumenta el aporte de insulina en la sangre. Como hay un sentido de intentar repeler la dulzura, puede que también haya afectación en los músculos extensores de los miembros superiores que sirven para repeler algo.

**Conflicto:** Conflicto de miedo y angustia por delante (por algo que viene de frente y vemos venir) con asco por alguien o alguna cosa determinada (para los diestros). Para los zurdos es un conflicto de miedo y angustia con resistencia.

Debemos tener presente que eso que nos produce miedo y repugnancia o asco en cierta forma también nos produce cierta dependencia y no nos es tan fácil librarnos de ello<sup>103</sup>.

"Me imponen algo (situación, alimentación, afección)". "Me resisto, me opongo a absorber azúcar".

Me resisto, pero no paso al ataque.

**Ver:** DIABETES