

PERIOSTIO

Definición: Membrana que rodea las partes del hueso que no están cubiertas por cartílago.

Técnico: 3^a y 4^a Etapas Embrionarias. Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto.

Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce hiperestesia (hipersensibilidad) y sensación de frío en el área afectada. Aparecen también fuertes dolores parecidos a los reumáticos. Puede haber pérdida de memoria a corto plazo.

Vagotonía: La fase de reparación del conflicto empieza con la disminución de la hipersensibilidad y el frío. Las pérdidas de memoria a corto plazo se acrecientan al principio de la fase y desaparecen al final. En la segunda parte de la fase, después de la epicrisis aparecen hormigueos y entumecimiento, y se normaliza la sensibilidad. En la fase de **crisis epileptoide** se producen ausencias o amnesias junto a un aumento de la sensibilidad con sensaciones de pinchazos. Se forma edema cerebral que puede provocar desmayos y la ya mencionada amnesia. Se puede plantear como un tejido del mesodermo nuevo (3^a etapa) y plantea una disminución de la sensibilidad en fase activa y recuperación en la de reparación. Es probable que exista algún caso en que la afectación periosteal sea una reminiscencia de un conflicto óseo y el funcionamiento biológico se invierta. Lo importante es ver cómo lo vive el inconsciente del consultante.

Sentido biológico: Es un tejido ectodérmico y se relaciona con el sistema nervioso y la piel. La sensibilidad del periostio es aumentada para sentir eso que nos fue “arrancado o separado”. Este patrón aunque opuesto al observado en la epidermis nos remonta a la sensibilidad más antigua presente en la mucosa de la fauce o faringe primitiva y en los derivados de los arcos branquiales. También la alteración que se presenta de la memoria a corto plazo tiene el propósito de olvidar la separación.

Conflicto: Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto no deseado y doloroso. Son los tocamientos, abusos, incestos... recibidos entre los 3 y los 14 años. Atención a la sintomatología: Si al rascarse se alivia el escozor, estamos

hablando de un conflicto de separación. Si tiene ganas de arrancarse la piel, entonces estamos hablando de un conflicto de agresión (contacto impuesto).

También puede ser un conflicto resentido por el agresor a modo de identificación y culpabilidad.

"Yo quiero separarme. Me toca y no quiero".

"No quiero que me toque mi estructura".