

RECTO

Definición: Último trozo de intestino grueso (15 cm.) que va desde el colon sigmoideo hasta el esfínter del ano.

Técnico: 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de expulsar pedazo. Conflicto de identidad y territorio.

Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa, aparece el adenocarcinoma bajo la mucosa del epitelio que recubre el recto. En 4ª etapa hay ulceración dolorosa de la mucosa rectal con espasmos y dolores.

Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, el tumor es degradado por necrosis, produciendo abscesos submucosos que se confunden con hemorroides internas. En 4ª etapa casi no hay dolor, pero si una tumefacción de la mucosa y sangrado de la úlcera que se repara. La sangre expulsada es clara y puede confundirse con sangrado hemorroidal. En 4ª etapa (mucosa) se vive en femenino.

Sentido biológico: Por un lado, tenemos el sentido de soltar. El pedazo (guarrada en este caso) ha pasado ya todas las fases del sistema digestivo y solo queda eliminarlo. Es tomar la última conciencia, por eso se fabrica más recto para que pueda realizarse el acto de "soltar". Por otro lado, la mucosa (4ª etapa) tiene el sentido territorial femenino de identidad (contacto, dónde me siento). Si afecta a la submucosa volveríamos al concepto de cochizada.

Conflicto: 1ª Etapa (crecimiento celular en parte superior): Conflicto de no poder expulsar el pedazo. No querer soltar una guarrada. No querer perdonar algo que guardamos. "Lo que me han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes". Impurezas que yo quiero eliminar. Eliminar algo putrefacto.

4ª Etapa (úlceras carcinomatosas), vivido en femenino, es un conflicto de pérdida o marcaje de territorio, conflictos de identidad. Mirar la relación con la madre. "He perdido mi lugar en el territorio". "Estoy en el punto de mira". "No nos sentimos reconocidos". "Tengo la impresión de no estar en mi casa". "No puedo manifestar quien soy"¹¹. No sé qué decisión tomar.

Fibrosis: Miedo a la muerte de la madre (real o simbólica).

Fibroma en el recto: Necesidad de retener a la madre.

Ver: ANO / COLON / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA

