

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

Tronco cerebral: 1ª Etapa (Supervivencia)

Desorientación

Conflicto: Constelación a nivel de tronco cerebral. Supervivencia.

IZQUIERDA DERECHA

Túbulos colectores del riñón izquierdo ---- Túbulos colectores del riñón derecho

Intestino delgado Íleon ---- Intestino delgado anterior Yeyuno

Intestino ciego con intestino grueso y parte proximal del colon transversal. ---- Duodeno

Intestino grueso descendente con distal del colon transversal. ---- Páncreas a Hígado

Núcleo del nervio acústico izquierdo ---- Núcleo del nervio acústico derecho

Recto sigmoide ---- Hígado / Estómago

Epitelio cilíndrico interior (submucoso) ---- Esófago 1/3 inferior Alvéolos pulmonares de los islotes profundos de la mucosa rectal, con epitelio intestinal; epitelio cilíndrico de la mucosa de la vejiga, solo en el llamado triángulo vesical, entre las desembocaduras uretrales y la salida de la uretra. Prepucio del pene con glándulas.

Faringe (garganta) izquierda. ----- Faringe (garganta) derecha.

Mucosa del cuerpo del útero ----- Mucosa del cuerpo del útero(izquierda) mucosa de las trompas (derecha) mucosa de las trompas de falopio (izquierda) y próstata - falopio (derecha) y próstata (derecha, izquierda)

Ejemplos:

1. Persona con miedo a la carencia (hígado) está a la derecha y le hacen una mala jugada (colon) está a la izquierda. Puede hacer una constelación de Consternación, está embrutecida tiene dos conflictos arcaicos activos. La finalidad de esta constelación es asegurar la subsistencia.
2. Miedo a la muerte (alvéolos) derecha, y se le suma un miedo a la pérdida (gónadas) izquierda. También puede hacer una consternación. Por ejemplo, en guerras o conflictos donde la vida está en juego.

3. Personas que tienen conflictos de Pulmón y Riñón, o de Riñón e Hígado. Esta persona se va a desorientar en el espacio.
4. Afectación de Riñón y Tiroides. Esto provocará desorientación espacio-temporal. Si es la Tiroides y otro relé será simplemente desorientación temporal.
5. Conflictos de vegetaciones: Son personas que exageran los detalles de pequeños problemas.
6. Cuando hay un conflicto de pérdida (gónadas) se puede constelar mediante exageraciones (alucinaciones) cuya finalidad es trascender la situación conflictiva y hacerla más llevadera.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 2ª ETAPA

Cerebelo: 2ª Etapa (Protección).

La persona puede sentirse agredida en un primer instante y se quiere proteger, hay un segundo bioshock en el que también se siente agredida, amenazada. La persona puede hacer un caparazón psíquico, la persona se puede colocar en un vacío emocional, será fría e insensible. Nos podemos encontrar a criminales, pedófilos, gente que se dedica a hacer daño sin ton ni son. Cuanto más son agredidos más se convierten en insensibles.

Conflicto: El sentido biológico es de supervivencia.

Resentir: "Me protejo para no ser agredido".

Una buena terapia serán las metáforas. Porque una manera de disociar a una persona que ya está disociada son las metáforas. Luego habrá que reconectarlas a la realidad. Las técnicas de PNL son muy interesantes en esta terapia. Otra terapia muy útil es la del teatro o la película: Los dos observamos la escena y la comentamos. Preguntamos cosas como ¿Qué crees que siente el protagonista? Buscamos un recurso y lo integramos en la película.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

Médula cerebral: 3ª Etapa (Movimiento, Valoración)

Conflicto: Son conflictos de desvalorización y movimiento, se expresarán en Megalomanías, conflicto de grandiosidad, o en conflictos de dirección que dará personas con falta de personalidad o con múltiples personalidades no válidas (desvalorizadas). **Resentir:** "No quiero ser más desvalorizado".

Los valores y las creencias dominan a estas personas y se comportan de manera que puedan realizar lo que piensan. Son personas que van a utilizar a los demás para su propia gloria. Es totalmente imposible que vean sus propios defectos porque serían demasiado insoportables para ellos. Rehúsan cualquier cuestionamiento.

El megalómano está obligado a tener buena opinión de sí mismo. Son personas que detestan que les tomen fotos o que los filmen. Acostumbran a tener un conflicto de desvalorización estética. Cuando se ven en una foto o en el espejo se asustan.

También en esta etapa está el conflicto de dirección, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Son personas que sienten, por ejemplo, que han tomado una mala dirección en el trabajo y con la mujer que han escogido. Son personas que en terapia hablan y hablan para asegurarse de que las entiendes y que no te equivoques de dirección. Hacen varias terapias, siguen varias religiones y varios maestros, así se aseguran de no equivocarse. Una forma de tratarlos es asociarlos a cada una de estas personalidades. Pretendemos que encuentren un punto en común para unirse y tomar una dirección.

Las personas con conflictos de 3ª etapa, suelen ser personas que o se ven demasiado o se ven poco. O pisan fuerte por donde pasan (megalomanía) o pasan como un fantasma sin molestar (conflicto de dirección).

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

Corteza cerebral: 4ª Etapa (Relación).

Conflicto: Diversos conflictos:

a) Depresión maníaco-depresiva: Son conflictos de territorio en ambos hemisferios. Según el grado o el tipo de conflicto aparecerán la depresión o la fase maníaca. La manía se presenta en relés del hemisferio izquierdo y la depresión en los del derecho. Una gran masa conflictual puede hacer que el individuo tenga levitaciones (delirios, imaginar su muerte, su propio entierro)

b) Constelación de flotar: No tocar de pies en el suelo. Es una constelación de bronquios y laringe y es muy protectora. Es mejor no tocarla a nivel terapéutico. Personas que se encuentran felices y con cierta euforia.

c) Bio-maníacas: Constelación entre el Recto (identidad) y la Orina (territorio). Personas que presentan a menudo conductas agresivas (sobre todo si hay predominio del hemisferio izquierdo o de identidad)

- d) Constelación de Autista en la corteza:** Se presenta entre dos relés, el de pánico (laringe, hemisferio izquierdo) y contrariedad en el territorio (vesícula biliar, derecho) o los brazos de la madre.
- e) Constelación paranoica:** Como por ejemplo alucinaciones auditivas (personas que están hartas de recibir información). Están formadas por constelaciones entre dos conflictos localizados en el mesencéfalo y la corteza.
- f) Constelación persecutoria:** Formada por dos relés en la parte occipital de la corteza, miedo a lo desconocido y miedo a lo que viene sin saber qué.
- g) Constelación de timidez extrema y ansiedad:** Suelen tener relés cerebrales en la parte frontal (miedo al porvenir). Estas constelaciones pueden proteger cánceres linfáticos.
- h) Constelación de hiperactividad:** Hay que buscar problemática con los padres. Normalmente es muy maniático y el relé afectado está en el hemisferio femenino (izquierdo).
- i) Constelación bulímica:** Formada por dos relés situados en el mesencéfalo izquierdo (rechazo, asco, repugnancia, de gran importancia protectora en la vida) y la corteza derecha del territorio.